

Coördinatie van medicijnen in de baxter

MCC Omnes heeft i.s.m. regionale partners, apothekers en thuiszorg-instanties een nadere invulling aan de weekterhandstelling (de baxter) gegeven.

Definitie

Er is sprake van een weekterhandstelling wanneer de patiënt/cliënt de medicatie zelf beheert en iemand anders verantwoordelijk is om het geneesmiddelenbeheer over te nemen.

Er is ook sprake van een weekterhandstelling wanneer de patiënt/cliënt verblijft in een verzorgingstehuis en hij/zij niet in staat is zonder een weekdoseerverpakking de geneesmiddelen bij zichzelf toe te dienen, dan wel te laten toedienen.

In het stroomschema wordt het aanvragen en controleren van de baxter weergegeven.

Verantwoordelijke zijn de huisarts ism de apotheker. De patiënt/cliënt is hier ook bij betrokken, aangezien deze continue betrokken is bij zijn medicatie-dossier.

De patiënt/cliënt dient middels toestemmingsformulier (LSP optin) de huisarts en apotheker toestemming te geven indien er sprake is van een weekterhandstelling.

Al dan niet stopzetten Baxters

Bij opname ziekenhuis

- *De duur van de opname is niet bekend, de verwachting is een langere opname.*

Indien een patiënt op baxter staat en langdurig opgenomen wordt in het ziekenhuis dan moet de medicatie gestopt worden door de huisarts. De huisarts stuurt een mail aan de apotheker (ASP).

- *De duur van de opname is kort.*

Indien een patiënt op baxter staat en kort opgenomen wordt in het ziekenhuis dan wordt de baxter niet stopgezet.

- *Niet geplande opnames*

Bij bepaalde opnames is in te schatten of deze lang of kortdurend zijn.

De huisarts stuurt een bericht naar de apotheker zodra bekend is of de opname van langere duur zal zijn. Geen bericht betekent dat de baxter door blijft lopen.

Bij opname verpleeghuis

In principe informeert het verpleeghuis middels een brief de leverende apotheek zodat deze de Baxter kan stopzetten.

Zodra de huisarts bekend is met de opname stuurt deze een bericht naar de apotheker.

De huisarts legt de onderbouwing van de weekterhandstelling vast in het patiëntendossier. Voor alle betrokkenen, huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties is het belangrijk controlemomenten in te bouwen om na te gaan of er tegenstrijdigheden zijn of dat zaken onvolledig zijn. Zijn er onvolledigheden dan wel tegenstrijdigheden geconstateerd moet direct uitgezocht worden wat de oorzaak hiervan is (bijvoorbeeld door overleg met behandelend arts of apotheek).