

Buikpijn poli kindergeneeskunde

Voor kinderen < 18 jaar

Er meldt zich bij de huisarts een kind met buikpijn:

Huisarts doet onderzoek conform de landelijke richtlijnen van het NHG. Zie <http://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/buikpijn-bij-kinderen>

In ieder geval wordt besproken:

- obstipatie
- psychosociale factoren
- school/pesten

Aanvullend onderzoek:

Lab:

- tTG en IgA (coeliakie)
- Hb Ht leuco diff en trombocyten en reticulocyten, Ferritine ASAT ALAT en LDH
- urineweginfectie uitgesloten (SCRU)
- parasitologie screening (PCR)

Huisarts komt niet tot een diagnose en behandelplan

Huisarts verwijst naar de buikpijn poli kindergeneeskunde met verzoek om 2 sporen beleid

Huisarts:

- informeert ouders over 2 sporen
- vraagt ouders groeigegevens mee te nemen naar consult kinderarts

Op de website van kindergeneeskunde wordt het bestaan en de werkwijze van de buikpijn poli beschreven. Hierbij wordt nadrukkelijk aangegeven dat verwijzing pas door de huisarts kan geschieden na een aantal geprotocolleerde onderzoeken

Intake en diagnostiek door GZ-Psycholoog

Onderzoek door kinderarts

Opstellen behandelplan in MDO

Terugkoppeling huisarts. Waar mogelijk behandeling in 1e lijn